

Cuadro 1. INDICADORES MÁS FRECUENTES EN EL MALTRATO FÍSICO INFANTIL

DATOS CLÍNICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Historia contradictoria, discordante o inaceptable - Retraso en la búsqueda de asistencia sanitaria - Padres que alegan accidentes sistemáticamente - Lesiones en diferentes estadios de evolución y asociadas a otras manifestaciones de maltrato. <p>Tiempo después del traumatismo según el color de los hematomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negruzco, azul oscuro: menos de un día. - Rojo violáceo: 1 a 5 días. - Rojo púrpura: 5 a 7 días. - Verdoso: 7 a 10 días. - Amarillento: 2 a 4 semanas. 	
LESIONES	PROVOCADAS	ACCIDENTALES
HEMATOMAS EQUIMOSIS LACERACIÓN HERIDAS	<ul style="list-style-type: none"> - Parte proximal de extremidades, zonas laterales de la cara. - Orejas y cuello, genitales y glúteos. - Lesiones de diferente localización - Lesiones bilaterales. - Identifican huellas de mano/dedos, arcada dentaria, cable eléctrico, hebilla, plancha, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cara –frente - Barbilla – mentón - Codos – espinilla - Crestas iliacas
QUEMADURAS	<ul style="list-style-type: none"> - Bordes nítidos y precisos - Salpicaduras ausentes - Forma de calcetín o guante, glúteos en casquete - Homogénea - 1º y 2º - Frecuencia bilateral 	<ul style="list-style-type: none"> - Difusos, irregulares. - Salpicaduras presentes - No definidos - No homogénea - 2º y 3º - Unilateral
POR CONTACTO	<ul style="list-style-type: none"> - Forma cigarrillos, plancha, radiador, tenedor. - Bordes nítidos y precisos - Zonas de castigo: orejas, mejillas, hombros, brazo, palma mano, pie, glúteos, genitales. 	<ul style="list-style-type: none"> - No visible, no precisa - Bordes difusos - Zonas descubiertas de la piel: frente, mentón, cuello, zona corbata, antebrazo.
MORDISCO	<ul style="list-style-type: none"> - Más de 3 cm de separación entre la huella de los caninos. 	
ALOPECIA TRAUMÁTICA	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de pelo en zonas sanas sin causa lógica o distribución determinada. - Diferente longitud de pelo. Frecuentemente en zona occipital-parental. 	
LESIONES OCULARES	<ul style="list-style-type: none"> - Debidos al Impacto directo sobre el ojo. - Consecuencias: atrofia óptica, ceguera. 	
LESIONES DENTALES	<ul style="list-style-type: none"> - Fracturas , desplazamientos. - Color diferente al normal debido a traumatismo. 	
LESIONES AUDITIVAS	<ul style="list-style-type: none"> - Debidos al Impacto directo sobre el oído. - Consecuencias: hipoacusia, conductiva o neurosensorial, sordera. 	
INTOXICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo de forma accidental por negligencia del adulto. - Administración intencional de sustancias. 	
LESIONES ABDOMINALES	<ul style="list-style-type: none"> - Dolor localizado. - Vómitos. - Hinchazón. 	