

ANALGESIA INTRAÓSEA Lidocaína 2% (1ml = 20mg)			
<b>ADULTOS (&gt;80kg)</b>			
1.- Lidocaína 2%: <b>2ml</b> (40mg) LENTA en 2min (de 0,2 en 0,2ml)			
50kg = 1,25ml	60kg = 1,5ml	70kg = 1,75ml	80kg = 2ml
2.- <b>ESPERAR 1min</b>			
3.- Bolo de lavado: <b>5-10ml SSF 0,9%</b> en 5sg			
4.- Si precisa, <b>segundo bolo</b> lidocaína: <b>1ml</b> (20mg) LENTO en 1min			
5.- <b>ESPERAR 1min</b>			
ANALGESIA INTRAÓSEA Lidocaína 2% (1ml = 20mg)			
<b>NIÑOS y LACTANTES</b>			
1.- Lidocaína 2%: <b>0,5mg/kg</b> LENTA en 2min (de 0,2 en 0,2ml)			
10kg = 0,25ml	20kg = 0,5ml	30kg = 0,75ml	40kg = 1ml
2.- <b>ESPERAR 1min</b>			
3.- Bolo de lavado: <b>2-5ml SSF 0,9%</b> en 5sg			
4.- Si precisa, <b>segundo bolo</b> lidocaína: <b>Mitad dosis inicial</b> , LENTO en 1 min			
5.- <b>ESPERAR 1min</b>			