

Procedimiento de Asistencia psicológica en violencia de género

Anexo 2 - Indicadores de sospecha en los antecedentes y características de la mujer

Antecedentes de violencia:

- Haber vivido otras relaciones de maltrato en la pareja.
- Haber sufrido o presenciado malos tratos en la infancia, abusos y/o agresiones sexuales.

Antecedentes personales y de hábitos de vida:

- Lesiones frecuentes.
- Otros problemas de salud frecuentes: dolores, trastornos del sueño y la alimentación.
- Abuso de alcohol, psicofármacos u otras drogas.

Problemas gineco-obstétricos:

- Ausencia de control de la fecundidad (muchos embarazos, embarazos no deseados).
- Presencia de lesiones en genitales, abdomen o mamas durante los embarazos.
- Dispareunia, dolor pélvico, infecciones ginecológicas de repetición, anorgasmia, dismenorrea.
- Historia de abortos repetidos.
- Hijos con bajo peso al nacer.
- Retraso en la solicitud de atención prenatal.

Síntomas psicológicos:

- Insomnio, depresión, ansiedad.
- Trastorno de estrés postraumático.
- Intentos de suicidio.
- Baja autoestima.
- Agotamiento psíquico.
- Irritabilidad.
- Trastornos de la conducta alimentaria.
- Labilidad emocional.

Aspectos Sociales:

- Aislamiento, escasas relaciones y actividades fuera de la familia, bajas laborales.

Síntomas físicos frecuentes:

- Cefalea, cervicalgia, dolor crónico en general.
- Mareos.
- Molestias gastrointestinales (diarrea, estreñimiento, dispepsia, vómitos, dolor abdominal).
- Molestias pélvicas.
- Dificultades respiratorias.

Utilización de servicios sanitarios:

- Existencia de periodos de hiperfrecuentación y otros de abandono (largas ausencias).
- Incumplimiento de citas o tratamientos.
- Uso repetitivo de los servicios de urgencias.
- Frecuentes hospitalizaciones.
- Acudir con la pareja cuando antes no lo hacía.

Situaciones de mayor vulnerabilidad:

- Situaciones de cambio vital.