

Cuadro 1. INDICADORES MÁS FRECUENTES EN EL MALTRATO FÍSICO INFANTIL

DATOS CLÍNICOS	- Historia contradictoria, discordante o inaceptable - Retraso en la búsqueda de asistencia sanitaria - Padres que alegan accidentes sistemáticamente - Lesiones en diferentes estadios de evolución y asociadas a otras manifestaciones de maltrato. Tiempo después del traumatismo según el color de los hematomas: - Negruzco, azul oscuro: menos de un día. - Rojo violáceo: 1 a 5 días. - Rojo púrpura: 5 a 7 días. - Verdoso: 7 a 10 días. - Amarillento: 2 a 4 semanas.	
LESIONES	PROVOCADAS	ACCIDENTALES
HEMATOMAS EQUIMOSIS LACERACIÓN HERIDAS	- Parte proximal de extremidades, zonas laterales de la cara. - Orejas y cuello, genitales y glúteos. - Lesiones de diferente localización - Lesiones bilaterales. - Identifican huellas de mano/dedos, arcada dentaria, cable eléctrico, hebilla, plancha, etc.	- Cara –frente - Barbilla – mentón - Codos – espinilla - Crestas iliacas
QUEMADURAS	- Bordes nítidos y precisos - Salpicaduras ausentes - Forma de calcetín o guante, glúteos en casquete - Homogénea - 1º y 2º - Frecuencia bilateral	- Difusos, irregulares. - Salpicaduras presentes - No definidos - No homogénea - 2º y 3º - Unilateral
POR CONTACTO	- Forma cigarrillos, plancha, radiador, tenedor. - Bordes nítidos y precisos - Zonas de castigo: orejas, mejillas, hombros, brazo, palma mano, pie, glúteos, genitales.	- No visible, no precisa - Bordes difusos - Zonas descubiertas de la piel: frente, mentón, cuello, zona corbata, antebrazo.
MORDISCO	- Más de 3 cm de separación entre la huella de los caninos.	
ALOPECIA TRAUMÁTICA	- Falta de pelo en zonas sanas sin causa lógica o distribución determinada. - Diferente longitud de pelo. Frecuentemente en zona occipital-parental.	
LESIONES OCULARES	- Debidos al Impacto directo sobre el ojo. - Consecuencias: atrofia óptica, ceguera.	
LESIONES DENTALES	- Fracturas , desplazamientos. - Color diferente al normal debido a traumatismo.	
LESIONES AUDITIVAS	- Debidos al Impacto directo sobre el oído. - Consecuencias: hipoacusia, conductiva o neurosensorial, sordera.	
INTOXICACIONES	- Consumo de forma accidental por negligencia del adulto. - Administración intencional de sustancias.	
LESIONES ABDOMINALES	- Dolor localizado. - Vómitos. - Hinchazón.	