

|                         |                    |                      |                  |                  |                         |                    |                                                                            |                                 |                                           |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5kg</b><br>(3 meses) | <b>FR</b><br>25-60 | <b>FC</b><br>100-180 | <b>TAS</b><br>75 | <b>TAM</b><br>60 | <b>Volemia</b><br>540ml | <b>Guedel</b><br>0 | <b>TET</b><br>3,5 – 4 <b>SIN</b> balón<br><i>Recomendaciones generales</i> | <b>Cm a introducir</b><br>12 cm | <b>Desfibrilación</b><br><b>20</b> julios |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARDIACA</b> | <b>ADRENALINA</b> (1mg/ml)<br><i>0,01mg/kg</i><br><b>PCR</b><br><b>Diluir</b> 1amp + 9ml SSF                       | <b>AMIODARONA</b><br>(50mg/ml)<br><b>PCR</b><br><i>5mg/kg</i>                                                                                                                            | <b>BICARBONATO1M</b><br>(1mEq/ml)<br><b>PCR</b><br><i>1mEq/kg</i>                         | <b>ATROPINA</b><br>(1mg/ml)<br><i>0,02mg/kg</i>                                      | <b>ADENOSINA</b> (3mg/ml)<br>1ª) <i>0,1-0,2mg/kg</i> (máx. 6mg)<br>2ª) <i>0,3mg/kg</i> (máx. 12-18mg)                                                  | <b>SULFATO DE MAGNESIO</b><br>(150mg/ml)<br><i>50mg/kg</i>                                |
|                 | <b>0,05mg=0,5ml</b> de diluida<br>c/ 3-5min<br><br>En Ritmo Desfibrilable tras 3ª descarga<br><br>(Dosis máx. 1mg) | <b>25mg</b><br><br>Poner <b>0,5ml SIN</b> diluir de <b>TRANGOREX®</b> BOLO (tras 3ª y 5ª descarga)<br><br><b><u>TAQUICARDIA</u></b><br><b>Diluir</b> 0,5ml en 10-20ml SG5% en 20 a 60min | <b>5mEq</b><br><br><b>Diluir 5ml + 5ml de SSF</b> pasar en 3 min<br><br>Lavar bien la vía | <b>0,1mg</b><br><br>SIN diluir<br><br><b>0,1ml</b><br><br>(0,1ml=0,1mg) (máx. 0,5mg) | (1ª) <b>0,5 - 1mg</b> / (2ª) <b>1,5mg</b><br><br>1ª) <b>0,16 - 0,3ml</b> SIN diluir<br>2ª) <b>0,5ml</b> SIN diluir<br><br>BOLO RÁPIDO<br><br>+ 5ml SSF | <b>250mg</b><br><br><b>Diluir 1,6ml</b> en 20 ml SG5% pasar en 10-20min<br><br>(máx. 2gr) |

Vía administración IV o IO, salvo otras indicaciones

|                   |                                                                 |                                                                        |                                                                        |                                                                               |                                                                    |                                                                           |                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>INTUBACIÓN</b> | <b>ATROPINA</b><br>(1mg/ml)<br><i>0,02mg/kg</i><br><b>0,1mg</b> | <b>FENTANILO</b><br>(50mcg/ml)<br><i>1-2mcg/kg</i><br><b>5 - 10mcg</b> | <b>KETAMINA</b><br>(50mg/ml)<br><i>0,5-2mg/kg</i><br><b>2,5 - 10mg</b> | <b>ETOMIDATO</b><br>(2mg/ml)<br><i>0,15 - 0,3mg/kg</i><br><b>0,75 – 1,5mg</b> | <b>SUCCINILCOLINA</b><br>(50mg/ml)<br><i>2mg/kg</i><br><b>10mg</b> | <b>MIDAZOLAM</b><br>(5mg/ml)<br><i>0,1-0,3mg/kg</i><br><b>0,5 – 1,5mg</b> | <b>ROCURONIO</b><br>(10mg/ml)<br><i>1mg/kg</i><br><b>5mg</b> |
|                   | SIN diluir<br><br><b>0,1ml</b><br>(máx. 0,5mg) BOLO             | <b>Diluir</b><br>1ml + 4ml SSF<br><br>(1ml = 10mcg) BOLO               | <b>Diluir</b><br>1ml + 4ml SSF<br><br>(1ml = 10mg) En 1-2 min          | SIN diluir<br><br><b>0,4 – 0,75ml</b><br><br>BOLO                             | <b>Diluir</b><br>1ml + 4ml SSF<br><br>(1ml = 10mg) BOLO            | <b>Diluir</b><br>1ml + 4ml SSF<br><br>(1ml = 1mg) BOLO                    | SIN diluir<br><br><b>0,5ml</b><br><br>BOLO                   |

|                |                                                               |                                                            |                                                                           |                                                                |                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>I.NASAL</b> | <b>FENTANILO</b> (50mcg/ml)<br><i>2mcg/kg</i><br><b>10mcg</b> | <b>MIDAZOLAM</b> (5mg/ml)<br><i>0,2mg/kg</i><br><b>1mg</b> | <b>KETAMINA</b> (50mg/ml)<br><i>3-5mg/kg (sedación)</i><br><b>15-25mg</b> | <b>NALOXONA</b> (0,4mg/ml)<br><i>0,02mg/kg</i><br><b>0,1mg</b> | <b>FLUMAZENILO</b> (0,1mg/ml)<br><i>0,02mg/kg</i><br><b>0,1mg</b> |
|                | SIN DILUIR<br><b>0,2ml</b>                                    | SIN DILUIR<br><b>0,2ml</b>                                 | SIN DILUIR<br><b>0,3 - 0,5ml</b>                                          | SIN DILUIR<br><b>0,25ml</b>                                    | SIN DILUIR<br><b>1ml</b>                                          |

| ANAFILAXIA | ADRENALINA (1mg/ml)                                                                   |                 |                                                           | Metilprednisolona 1 - 2mg/kg (IV o IM)                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | INTRAMUSCULAR (muslo)<br>(0,01mg/kg)                                                  | Perfusión       | Nebulizado ( <i>Estridor Inspiratorio</i> )<br>(0,5mg/kg) | 5 - 10 mg                                                                                      |
|            | SIN DILUIR<br><b>0,05 mg = 0,05ml</b><br>(máx. 0,5mg)<br>Se puede repetir c/ 5-10 min | Ver perfusiones | <b>2,5ml</b> (Máximo 5ml)<br>+ 7,5ml SSF                  | BOLO de 3min<br>Diluir 1 vial de 40mg en 4ml SSF. De esa dilución administrar 0,5 – 1ml lento. |

Vía administración IV o IO, salvo otras indicaciones

| CONVULSIONES | DIAZEPAM (5mg/ml)                                                                                 |                                       | MIDAZOLAM (5mg/ml)<br>0,2mg/kg                                                          | KETAMINA (50mg/ml)<br>0,5 – 2mg/kg                                                | LEVETIRACETAM<br>(100mg/ml) 50mg/kg                                               | GLUCOSA 10%<br>3 ml/kg                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | IV 0,3mg/kg<br><b>1,5mg</b><br><i>Diluir</i><br>2ml + 8ml SSF<br>(1ml = 1mg)<br>(máx. 10mg/dosis) | RECTAL 0,5mg/kg<br><b>No indicado</b> | <b>1mg</b><br><i>Diluir</i><br>1ml + 4ml SSF<br>(1ml = 1mg)<br>BOLO<br>(máx. 5mg/dosis) | <b>2,5 – 10mg</b><br><i>Diluir</i><br>1ml + 4ml SSF<br>(1ml = 10mg)<br>En 1-2 min | <b>250mg</b><br><b>2,5ml</b><br>Diluir en 50ml<br>SSF o SG5%<br>pasar en 15-20min | <b>15 ml</b><br><u>Obtener al 10%:</u><br>Sacar 10ml a un suero de 100ml SG5% y añadir 10ml de Glucosa 50%<br>VIA GRUESO CALIBRE |
|              |                                                                                                   |                                       |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                  |

| PERFUSIONES más habituales | DOPAMINA (20mg/ml)<br>5 - 20mcg/kg/min                                                                                                                                                 | ADRENALINA<br>0,1-1mcg/kg/min<br>NORADRENALINA<br>0,1-2mcg/kg/min                                                                                                        | S. HIPERTÓNICO 3%<br>5ml/kg                                                                                                      | AMIODARONA (50mg/ml)<br>5mcg/kg/min                                               | TRANEXÁMICO (100mg/ml)<br>20mg/kg                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 6 x peso (kg) = <b>mg</b><br>( <b>1,5ml</b> ) de Dopamina a diluir HASTA 100ml SG5% o SSF 0,9%<br><br>Poner 5 - 20ml/h según necesidad.<br><br>Correspondiendo:<br>5ml/h = 5mcg/kg/min | 0,6 x peso (kg) = <b>mg</b> de Adrenalina/Nora a diluir HASTA 100ml SG5%<br><br>Poner 1ml/h e ir aumentando de 1 en 1ml<br><br>Correspondiendo:<br>1ml/h = 0,1mcg/kg/min | Para obtener al 3%:<br>Añadir 10ml de ClNa20% a 90ml de SSF<br><br>Dosis: <b>25ml</b><br>BOLO de 10min<br><br>Vía GRUESO CALIBRE | Añadir:<br>1ml de amiodarona en 50ml SG5% (1ml=1mg)<br><br>Poner a <b>0,5ml/h</b> | <b>100mg</b><br><b>1ml</b> hasta 20ml de SSF o SG5%<br><br>En, al menos, 10min<br><br>(Dosis máx. 1gr) |
|                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                        |