

10kg (1 año)	FR 20-50	FC 100-170	TAS 95	TAM 65	Volemia 800ml	Guedel 2	TET 4 – 4,5 SIN balón 3,5 – 4 CON balón	Cm a introducir 12,5 cm	Desfibrilación 40 julios
------------------------	--------------------	----------------------	------------------	------------------	-------------------------	--------------------	--	-----------------------------------	---

CARDIACA	ADRENALINA (1mg/ml) <i>0,01mg/kg</i> PCR Diluir 1amp + 9ml SSF	AMIODARONA (50mg/ml) PCR <i>5mg/kg</i>	BICARBONATO 1M (1mEq/ml) PCR <i>1mEq/kg</i>	ATROPINA (1mg/ml) <i>0,02mg/kg</i>	ADENOSINA (3mg/ml) 1ª) <i>0,1- 0,2mg/kg</i> (máx. 6mg) 2ª) <i>0,3mg/kg</i> (máx. 12-18mg)	SULFATO DE MAGNESIO (150mg/ml) <i>50mg/kg</i>
	0,1mg = 1ml de diluida	50mg	10mEq	0,2mg	(1ª) 1 - 2mg / (2ª) 3mg	500mg
	c/ 3-5min En Ritmo Desfibrilable tras 3ª descarga (Dosis máx. 1mg)	Poner 1ml SIN diluir de TRANGOREX® BOLO (tras 3ª y 5ª descarga) TAQUICARDIA Diluir 1ml en 20ml SG5% en 20 a 60min	Diluir 10ml + 10ml de SSF pasar en 3 min Lavar bien la vía	SIN diluir 0,2ml (0,1ml=0,1mg) (máx. 0,5mg)	(1ª) 0,3 – 0,7ml SIN diluir (2ª) 1ml SIN diluir BOLO RÁPIDO + 10ml SSF	Diluir 3,3ml en 20 ml SG5% pasar en 10-20min (máx. 2gr)

Vía administración IV o IO, salvo otras indicaciones

INTUBACIÓN	ATROPINA (1mg/ml) <i>0,02mg/kg</i>	FENTANILO (50mcg/ml) <i>1-2mcg/kg</i>	KETAMINA (50mg/ml) <i>0,5 - 2mg/kg</i>	ETOMIDATO (2mg/ml) <i>0,15 - 0,3mg/kg</i>	SUCCINILCOLINA (50mg/ml) <i>1mg/kg</i>	MIDAZOLAM (5mg/ml) <i>0,1-0,3mg/kg</i>	ROCURONIO (10mg/ml) <i>1mg/kg</i>
	0,2mg SIN diluir 0,2ml (máx. 0,5mg) BOLO	10 - 20mcg Diluir 1ml + 4ml SSF (1ml = 10mcg) BOLO	5 - 20mg Diluir 1ml + 4ml SSF (1ml = 10mg) En 1-2min	1,5 - 3mg SIN diluir 0,75 – 1,5ml BOLO	10mg Diluir 1ml + 4ml SSF (1ml = 10mg) BOLO	1 - 3mg Diluir 1ml + 4ml SSF (1ml = 1mg) BOLO	10mg SIN diluir 1ml BOLO

I.NASAL	FENTANILO (50mcg/ml) <i>2mcg/kg</i> 20mcg SIN DILUIR 0,4ml	MIDAZOLAM (5mg/ml) <i>0,2mg/kg</i> 2mg SIN DILUIR 0,4ml	KETAMINA (50mg/ml) <i>3-5mg/kg (sedación)</i> 30-50mg SIN DILUIR 0,6 - 1ml	NALOXONA (0,4mg/ml) <i>0,02mg/kg</i> 0,2mg SIN DILUIR 0,5ml	FLUMAZENILO (0,1mg/ml) <i>0,02mg/kg</i> 0,2mg SIN DILUIR 2ml
----------------	---	--	---	--	---

ANAFILAXIA	ADRENALINA (1mg/ml)			Metilprednisolona 1-2mg/kg (IV o IM)
	INTRAMUSCULAR (muslo) (0,01mg/kg)	Perfusión	Nebulizado (<i>Estridor inspiratorio</i>) (0,5mg/kg)	10 - 20 mg (máx. 60mg)
	SIN DILUIR 0,1mg = 0,1ml (máx. 0,5mg) Se puede repetir c/ 5-10min	Ver perfusiones	5ml (Máximo 5ml) + 5ml SSF	BOLO de 3min Diluir 1 vial de 40mg en 4ml SSF. De esa dilución administrar 1-2ml lento.

Vía administración IV o IO, salvo otras indicaciones

CONVULSIONES	DIAZEPAM (5mg/ml)		MIDAZOLAM (5mg/ml) 0,2mg/kg	KETAMINA (50mg/ml) 0,5 – 2mg/kg	LEVETIRACETAM (100mg/ml) 50mg/kg	GLUCOSA 10% 3ml/kg
	IV 0,3mg/kg 3mg Diluir 2ml + 8ml SSF (1ml = 1mg) (máx. 10mg/dosis)	RECTAL 0,5mg/kg 5mg SIN DILUIR 1ml (cánula hasta la segunda marca)	2mg Diluir 1ml + 4ml SSF (1ml = 1mg) BOLO (máx. 5mg/dosis)	5 – 20mg Diluir 1ml + 4ml SSF (1ml = 10mg) En 1-2min	500mg 5ml Diluir en 100ml SSF o SG5% Pasar en 15-20min	30 ml <u>Obtener al 10%:</u> Sacar 10ml a un suero de 100ml SG5% y añadir 10ml de Glucosa 50% VIA GRUESO CALIBRE

PERFUSIONES más habituales	DOPAMINA (20mg/ml) 5 – 20 mcg/kg/min	ADRENALINA 0,1 - 1mcg/kg/min NORADRENALINA 0,1 - 2mcg/kg/min	S. HIPERTÓNICO 3% 5ml/kg	AMIODARONA (50mg/ml) 5mcg/kg/min	TRANEXÁMICO (100mg/ml) 15-20mg/kg
	6 x peso (kg) = mg (3ml) de Dopamina a diluir HASTA 100ml SG5% o SSF 0,9% Poner 5 - 20ml/h según necesidad. Correspondiendo: 1ml/h = 1mcg/kg/min	0,6 x peso (kg) = mg de Adrenalina/Nora a diluir HASTA 100ml SG5% Poner 1ml/h e ir aumentando de 1 en 1ml Correspondiendo: 1ml/h = 0,1mcg/kg/min	Para obtener al 3% : Añadir 10ml de ClNa20% a 90ml de SSF Dosis: 50ml BOLO de 5-10min Vía GRUESO CALIBRE	Añadir: 1ml de amiodarona en 50ml SG5% Poner a 3ml/h	150 – 200mg 1,5 – 2ml hasta 20ml de SSF o SG5% En, al menos, 10min (Dosis máx. 1gr)