

Recomendaciones Generales **PEDIATRÍA**

PESO (kg) = (edad en años + 4) x 2
1 año – 10kg
5 años – 20kg
9-10 años – 30kg

VALORES NORMALES Orientativos

EDAD	1 – 3 meses	1 año	5 años	9-10 años
FC normal (Límite Inf/Sup)	120 (100/180)	110 (100/170)	90 (70/140)	85 (60/120)
FR normal (Límite Inf/Sup)	35 (25/60)	30 (20/50)	20 (17/30)	17 (14/25)
TAS normal (límite inferior)	75 (50)	95 (70)	100 (80)	110 (90)
TAM normal (límite inferior)	60 (55)	65 (55)	70 (60)	80 (65)

TAMAÑO TET

	SIN Balón	CON Balón
Recién nacido prematuro	E. Gestacional en semanas/10 (2,5-3,5)	No se usan
Recién nacido a término	3,5	No se usan habitualmente
Lactante	3,5 – 4,0	3,0 – 3,5
Niño 1 – 2 años	4,0 – 4,5	3,5 – 4,0
Niño > 2 años	4 + (Edad en años/4)	3,5 + (Edad en años/4)

LONGITUD TET a Introducir Orientativa

TET colocado **vía oral**: longitud desde los LABIOS = 12 + (edad / 2) cm

PARÁMETROS INICIALES VENTILACIÓN MECÁNICA

VOLUMEN Control: volumen corriente = 6 - 8 ml/kg (ajustado para correcta elevación torácica)
PRESIÓN Control: Pico de presión inspiratoria = 20 – 25cm de H ₂ O
Frecuencia Respiratoria apropiada a la edad
Relación I:E 1:2
PEEP : 5cm H ₂ O
FiO₂ : Empezar con 100% y disminuir, en cuanto se pueda, hasta <60%, para SatO ₂ diana 94-98%
Alarma de presión : 35 – 40 mmHg